# DEXOREN®

**Digitalique**

## Dans quel cas le médicament DEXOREN®est-il prescrit ?

Ce médicament aux propriétés multiples appartient à la famille des digitaliques : il agit sur le cœur en permettant essentiellement d'en renforcer les contractions et de ralentir son rythme lorsqu'il est excessif.

Il est utilisé dans le traitement de l'*insuffisance cardiaque* et de certaines tachycardies.

## Présentations du médicament DEXOREN®

**DEXOREN®0,25 mg** : comprimé *sécable* ; boîte de 20

## Composition du médicament DEXOREN®

| | **p cp** |
|---|---|
| Digoxine | 0,25 mg |

## Contre-indications du médicament DEXOREN®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- certaines anomalies du fonctionnement cardiaque,
- en association avec le sultopride ou des injections intraveineuses de calcium.
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

## Attention

Ce produit est très toxique en cas de *surdosage* : tenez-le hors de portée des enfants.

En cas de *palpitations* récentes survenues sous traitement, prévenez votre médecin.

Des précautions sont nécessaires en cas d'*insuffisance rénale* ou d'*hypothyroïdie* et chez la personne âgée.

Tout médicament susceptible de faire baisser la *kaliémie*, notamment les diurétiques ou les *laxatifs stimulants*, devra être utilisé sous contrôle médical strict.

En cas d'intervention chirurgicale, l'anesthésiste doit être prévenu de la prise de ce médicament.

## Interactions du médicament DEXOREN®

Ce médicament ne doit pas être associé au calcium injectable par *voie intraveineuse* ni au sultopride : risque de troubles du rythme cardiaque graves.

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un médicament susceptible de favoriser une *hypokaliémie*, un *pansement digestif*, un médicament contenant l'une des substances suivantes : charbon, kaolin, colestyramine, hydroquinidine, quinidine, sucralfate, amiodarone, sulfasalazine, vérapamil, clarithromycine, érythromycine, carbamazépine, calcium (par *voie* orale).

## Fertilité, grossesse et allaitement

### Grossesse :

Il n'a pas été mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation de ce médicament chez la femme enceinte. Toutefois, au cours des 3 derniers mois de la grossesse, il peut être nécessaire d'adapter la posologie.

### Allaitement :

Ce médicament passe en très faible quantité dans le lait maternel. Demandez l'avis de votre médecin.

## Mode d'emploi et posologie du médicament DEXOREN®

### Posologie usuelle :

*Traitement d'attaque* : une forte dose est parfois prescrite par le médecin pendant quelques jours, sous surveillance médicale.

Traitement d'entretien : la posologie est adaptée par le médecin en fonction de l'effet recherché ; une analyse de sang permet de connaître la concentration du médicament dans le sang : en effet, le risque de *surdosage* est important.

## Effets indésirables possibles du médicament DEXOREN®

Ils sont le plus souvent le signe d'un *surdosage* :

- nausées, vomissements, *diarrhée*, perte de l'appétit ;
- coloration en jaune de la vision ;
- vertiges, maux de tête ;
- troubles psychiques, notamment chez la personne âgée ;
- troubles du rythme cardiaque variés, *palpitations*.

Exceptionnellement : *gynécomastie*, *éruption cutanée*.